

DIAGNOSTICO, MANEJO Y PREVENCIÓN ALGUNAS ENFERMEDADES DERMATOLÓGICAS PREVALENTES

Álvaro Correa Sánchez
Dermatología y Dermatología
Docente de pre y postgrado Medicina Interna
Universidad Libre y Simón Bolívar
Barranquilla-Colombia

El autor declara no tener ningún conflicto de intereses.

SOCIEDADES CIENTIFICAS



Sociedad Médico Quirúrgica del Atlántico



Asociación Dermatológica del Atlántico



Asociación Dermatológica del Caribe



Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía
Dermatológica



Colegio Iberoamericano de Dermatología

FASES DE PRESENTACION CLINICA INFLAMATORIOS DE LA PIEL

AGUDA



- Secreciones
- Costras
- Inflamación
- Infección

Impetiginización

SUBAGUDA




- Involución

CRONICA



- Secas
- Descamación
- Liquenificación



CLINICA DE LOS PROCESOS INFLAMATORIOS DE LA PIEL

AGUDA



SUBAGUDA



CRONICA



ANTIBIOTICOS

AGENTES CAUSANTES

- *Estafilococo áureos*
- *Streptococo pyogenes*
- *Pseudomonas sp*

TOPICOS

- Acido fusídico
- Mupirucina

SISTEMICOS

- Penicilina, eritromicina
- Penicilinasas
- Sulfas: TMTS
- Quinolonas :Ciprofloxacina

Polvo



Domeboro®

ACETATO DE ALUMINIO

Favorece la limpieza, desinfección, cicatrización y tratamiento de las afecciones en piel.

pH 4.2 25 SOBRES DE 2,2 g CADA UNO

MEDICAMENTO ESENCIAL

Contiene
30 Sobres de 3g.




SANI-LYX

Polvo para preparar solución desodorante


ACETATO ALUMINIO	ACIDO BORICO
Solución Burrow's	Acido bórico
Baños, Paños / compresas	
Diluir 1 sobre por lt de agua por 20 minutos, 2-3 veces al día	

ESTEROIDES TOPICOS



EFECTOS COLATERALES ESTEROIDES TOPICOS

(Se aplican cada 12 horas por 15 días máximo)




MILIARIA RUBRA

- Obstrucción con retención de sodio
- Frecuente en niños
- Bañar 3 veces día
- Sustancias mentoladas
- Calamina
- Acido ascórbico oral
- Eritromicina



PRURIGO POR INSECTO (mosquitos)



Su saliva hace que el cuerpo genere histamina, desencadenando la reacción en roncha



PRURIGO POR INSECTO



PICADURA
DE
MOSQUITO




PICADURA
DE
PULGA





PRURIGO POR INSECTO

- Esteroide tópico:
Mañana y noche.
- Antihistamínicos orales.
- Repelentes tópicos u orales.
- Antibióticos orales o tópicos en caso necesario.
- Prevención.



ESCABIOSIS (SARNA)





ESCABIOSIS

Niños escolares y adultos


- **Permetrina**

Aplicar de noche por 3 días.

Niños menores de 6 meses

- **Vaselina con azufre 5%**

Aplicar noche x 24 horas por 3 días.



IVERMECTINA

*Sarcoptes
scabiei
hominis*



Pediculus capitis



Larva migrans cutánea

PREVENCION

- Ropa de cama
- Ropa de baño
- Ropa personal
- Interiores




AGUA
Sin Jabón
Sin hervir



Toda la noche
Por una
semana



LARVA MIGRANS CUTANEA



LARVA MIGRANS CUTANEA



LARVA MIGRANS CUTANEA

- ALBENDAZOL
2 tabletas 200 mg una dosis.
- IVERMECTINA
1 gota kg/peso ayunas.

Antihistamínico oral
Esteroides tópicos fluorados



GLOSITIS CANDIDIASICA

- Enjuagues con bicarbonato de sodio.
- Fluconazol capsulas 200 mg cada 3 días.
- Miconazol (Daktarin) gel
Aplicar 3 veces al día después de las comidas.
- Nistatina.
- Recomendaciones.



FACTORES PREDISPONENTES

- Uso de esteroides tópicos y conjugados.
- Esteroides y antibióticos orales en no circuncidados.
- Mala higiene y aseo.
- Prepucio redundante.
- Diabéticos, obesos.
- Preservativos (látex, espermicidas).
- Relaciones sexuales.



FACTORES PREDISPONENTES

- Drogas inmunosupresoras y citostáticas.
- VIH-SIDA.
- Enfermedades del colágeno.
- Trasplantados.
- Fimosis.
- Promiscuidad.
- Interiores de licra.
- Jabones cáusticos.



TERAPIA / MANEJO

- Baños de Acetato aluminio o sanilix 2 v/día por 20-30´
- Antimicótico tópico 2 veces al día.
- Fluconazol 200 mg vía oral.
- Prevención y recomendaciones.



TIÑAS - EMPEINES

CORPORIS, CRURIS, FASCIE, PEDIS

FLUCONAZOL 200 mg c/3 días por mas de un mes.

TERBINAFINA 250 mg/día x 3 meses.

UNGUEAL

FLUCONAZOL 200 mg c/3 días de 6 a 12 meses.

TERBINAFINA 250 mg/día x 3 meses o más.





FLUCONAZOL





TERBINAFINA





HIDROCORTISONA tópica mañana - noche por 7 días.
ANTIMICOTICO tópico por 3 meses mañana - noche

ERISIPELA / CELULITIS

- *Estafilococo áureus*

AMPOLLOSA

- *Streptococo pyogenes*

NO AMPOLLOSA

MIXTA

- Inmunosuprimidos.
- Drogas citostáticas e inmunosupresoras
- Diabéticos, Trasplantados.
- Traumas, mordeduras, picadas.
- Obesidad
- Tendencia a la repetición.



- Estafilocócica ampollosa (*aureus*)

PENICILINASAS

- Estreptocócicas (*pyogenes*)

PENICILINA

- Mixtas

CEFALEXINAS

CIPROFLOXACINA

SULFAS

- Compresas acetato aluminio mañana noche por 20-30 minutos.
- Acido fusídico crema 2 veces al día.
- Reposo, elevación de la pierna.



DERMATITIS CONTACTO DESODORANTES

- Separar contactante.
- Compresas:
 - Acido bórico
 - Acetato aluminio
- Antibióticos orales
- Antibióticos tópicos
- Esteroides no fluorados
- All over spray.





SICOSIS DE LA BARBA



SICOSIS DE LA BARBA




SICOSIS DE LA BARBA





SICOSIS DE LA BARBA

- Antibióticos orales
- Antibióticos tópicos
- Acido ascórbico
- Aseo de la zona
- Prevención mecánica del rasurado



SICOSIS DE LA BARBA



SICOSIS DE LA BARBA



CONCLUSIONES

“La puntualidad
no es sólo
llegar a la
hora, es también
marcharse a
tiempo”.

GRACIAS A DIOS
POR TODO EN MI VIDA.
LO BUENO Y LO MALO.
ALGUNAS FUERON
BENDICIONES
Y OTRAS FUERON
LECCIONES.

fraseperfecta.com

